

УДК 512.543

НЕКОТОРЫЕ АППРОКСИМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ ГРУПП И РАСЩЕПЛЯЕМЫХ РАСШИРЕНИЙ¹

Д. Н. Азаров

Доказано, что для каждого конечного множества π простых чисел существует полициклическая группа, которая аппроксимируема конечными p -группами для тех и только тех простых чисел p , которые принадлежат множеству π .

Ключевые слова: полициклическая группа, расщепляемое расширение.

1. Введение

Напомним, что группа G называется *финитно аппроксимируемой*, если для каждого неединичного элемента $a \in G$ существует гомоморфизм φ группы G на некоторую конечную группу, переводящий элемент a в неединичный элемент.

Одним из обобщений этого понятия является свойство аппроксимируемости произвольным фиксированным классом групп. Пусть \mathcal{K} — некоторый класс групп. Группа G называется *аппроксимируемой группами из класса \mathcal{K}* (или, короче, *\mathcal{K} -аппроксимируемой*), если для любого неединичного элемента a группы G существует гомоморфизм группы G на некоторую группу из класса \mathcal{K} , при котором образ элемента a отличен от 1.

Если \mathcal{F} обозначает класс всех конечных групп, то понятие \mathcal{F} -аппроксимируемости совпадает с понятием финитной аппроксимируемости. Наряду с финитной аппроксимируемостью изучается также более тонкое свойство \mathcal{F}_p -аппроксимируемости, где p — простое число, \mathcal{F}_p — класс всех конечных p -групп.

В своем историческом обзоре [1] Б. Чандлер и В. Магнус свидетельствуют, что понятие финитно аппроксимируемой группы введено А. И. Мальцевым в 1940 г. в его статье «О представлении бесконечных групп матрицами» [2]. Заметим, что в этой работе термин «аппроксимируемость» еще не использовался. Этот термин был введен А. И. Мальцевым в 1949 г. в его работе [3], посвященной нильпотентным группам и алгебрам. На английском языке соответствующий термин был введен Ф. Холлом в 1955 г.

В упомянутой выше работе [2] А. И. Мальцев установил финитную аппроксимируемость произвольной конечно порожденной линейной группы. Отсюда следует, что все свободные группы и все полициклические группы финитно аппроксимируемы. Финитная аппроксимируемость полициклических групп независимо от результата Мальцева была установлена К. Гиршем [4].

© 2015 Азаров Д. Н.

¹Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки в рамках выполнения НИР по государственному заданию.

Напомним, что группа называется полициклической (сверхразрешимой), если она обладает субнормальным (нормальным) рядом с циклическими факторами. Полициклические группы являются исторически первым содержательным примером финитно аппроксимируемых групп. Вопрос об их \mathcal{F}_p -аппроксимируемости не исследован, но в работе А. Л. Шмелькина [5] устанавливается следующее свойство полициклических групп, являющееся промежуточным между \mathcal{F} -аппроксимируемостью и \mathcal{F}_p -аппроксимируемостью.

Любая полициклическая группа почти \mathcal{F}_p -аппроксимируема для каждого простого числа p .

Напомним, что группа G называется почти \mathcal{F}_p -аппроксимируемой, если она содержит \mathcal{F}_p -аппроксимируемую подгруппу конечного индекса.

Вопрос об \mathcal{F}_p -аппроксимируемости полициклических групп полностью исследован только для некоторых классов полициклических групп, например, для класса конечно порожденных нильпотентных групп и для более широкого класса сверхразрешимых групп. Еще в работе К. Грюнберга [6] была доказана следующая теорема.

Любая конечно порожденная нильпотентная группа без кручения \mathcal{F}_p -аппроксимируема для каждого простого числа p .

Для произвольной конечно порожденной нильпотентной группы соответствующий критерий формулируется следующим образом (см., например, [7]).

Конечно порожденная нильпотентная группа \mathcal{F}_p -аппроксимируема тогда и только тогда, когда все ее элементы конечного порядка являются p -элементами.

Элемент конечного порядка мы называем p -элементом, если его порядок является степенью числа p .

Вопрос об \mathcal{F}_p -аппроксимируемости сверхразрешимых групп сводится к аналогичному вопросу для конечно порожденных нильпотентных групп следующим образом.

Если сверхразрешимая группа \mathcal{F}_p -аппроксимируема для нечетного простого числа p , то она нильпотентна. Сверхразрешимая группа \mathcal{F}_2 -аппроксимируема тогда и только тогда, когда все ее элементы конечного порядка являются 2-элементами. В частности, любая сверхразрешимая группа без кручения \mathcal{F}_2 -аппроксимируема.

Этот результат был получен автором настоящей статьи совместно с Д. И. Молдаванским в работе [8].

По-видимому, единственным результатом общего характера об \mathcal{F}_p -аппроксимируемости произвольной полициклической группы на протяжении многих лет продолжает оставаться следующая знаменитая теорема К. Сексенбаева [9].

Если полициклическая группа \mathcal{F}_p -аппроксимируема для каждого простого числа p из некоторого бесконечного множества простых чисел, то она является нильпотентной группой без кручения.

Для произвольной группы G через π_G будем обозначать множество всех простых чисел p , для которых группа G является \mathcal{F}_p -аппроксимируемой. Из сформулированных выше результатов Сексенбаева и Грюнберга непосредственно вытекает следующее утверждение.

Для полициклической группы G множество π_G либо конечно, либо совпадает с множеством всех простых чисел.

В связи с этим утверждением здесь будет доказана следующая

Теорема 1. *Для произвольного конечного множества π простых чисел существует полициклическая группа G такая, что $\pi_G = \pi$.*

При исследовании полициклических групп особое значение имеет конструкция расщепляемого расширения. Напомним, что группа P называется расщепляемым расширением группы G с помощью группы T , если G — нормальная подгруппа группы P , T — подгруппа группы P , $P = GT$ и $G \cap T = 1$. Хорошо известно и легко проверяется, что любое расширение с помощью бесконечной циклической группы расщепляемо. Поэтому, если в полициклической группе G рассмотреть субнормальный ряд

$$1 = G_0 \leq G_1 \leq \dots \leq G_n = G \quad (1)$$

с циклическими факторами, то для каждого $k = 1, 2, \dots, n$ группа G_k является либо конечным расширением группы G_{k-1} , либо расщепляемым расширением группы G_{k-1} с помощью бесконечной циклической группы. Поэтому сформулированные выше результаты Гирша и Шмелькина о полициклических группах могут быть легко доказаны индукцией по n с помощью следующего результата.

Расщепляемое расширение конечно порожденной \mathcal{F} -аппроксимируемой (почти \mathcal{F}_p -аппроксимируемой) группы с помощью \mathcal{F} -аппроксимируемой (почти \mathcal{F}_p -аппроксимируемой) группы само является \mathcal{F} -аппроксимируемой (почти \mathcal{F}_p -аппроксимируемой) группой.

В части, касающейся \mathcal{F} -аппроксимируемости это утверждение доказано А. И. Мальцевым в работе [10]. Вторая половина этой теоремы доказана автором настоящей статьи в работе [11].

Простые примеры показывают, что расщепляемое расширение конечно порожденной \mathcal{F}_p -аппроксимируемой группы с помощью \mathcal{F}_p -аппроксимируемой группы не обязано быть \mathcal{F}_p -аппроксимируемой группой. Для такого расщепляемого расширения здесь будет доказано следующее достаточное условие \mathcal{F}_p -аппроксимируемости.

Теорема 2. *Пусть P — расщепляемое расширение конечно порожденной \mathcal{F}_p -аппроксимируемой группы G с помощью \mathcal{F}_p -аппроксимируемой группы T . Если подгруппа T субнормальна в группе P , то группа P является \mathcal{F}_p -аппроксимируемой.*

Так как в нильпотентной группе все подгруппы субнормальны, а в конечно порожденной нильпотентной группе без кручения существует нормальный ряд с бесконечными циклическими факторами, то в любой конечно порожденной нильпотентной группе G без кручения существует нормальный ряд вида (1) такой, что для каждого $k = 1, 2, \dots, n$ группа G_k является расщепляемым расширением группы G_{k-1} с помощью бесконечной циклической субнормальной подгруппы. Поэтому результат Грюнберга о \mathcal{F}_p -аппроксимируемости конечно порожденной нильпотентной группы без кручения может быть легко доказан с помощью теоремы 2 индукцией по длине ряда (1).

Поиск необходимого и достаточного условия \mathcal{F}_p -аппроксимируемости расщепляемых расширений, по-видимому, является трудной задачей. Об этом свидетельствует тот факт, что соответствующие критерии, полученные для самых простых частных случаев, формулируются и доказываются нетривиально.

Так, например, в работе [12] получен критерий \mathcal{F}_p -аппроксимируемости расщепляемого расширения свободной абелевой группы конечного ранга с помощью бесконечной циклической группы. Для его формулировки введем следующие обозначения. Пусть G — свободная абелева группа конечного ранга, φ — автоморфизм группы G . И пусть P — соответствующее автоморфизму φ полупрямое произведение группы G и бесконечной циклической группы $T = \langle t \rangle$. Это означает, что группа P представляет собой расщепляемое расширение группы G с помощью группы T , и для каждого элемента $g \in G$ имеет

место равенство $t^{-1}gt = g\varphi$. Обозначим через $h(x)$ характеристический многочлен автоморфизма φ . В [12] доказано, что группа P является \mathcal{F}_p -аппроксимируемой тогда и только тогда, когда число p делит $f(1)$ для любого неприводимого делителя $f(x) \in Z[x]$ многочлена $h(x)$. В случае, когда ранг свободной абелевой группы G равен 2, критерий \mathcal{F}_p -аппроксимируемости группы P допускает следующую более простую формулировку.

Теорема 3. Пусть G — свободная абелева группа ранга 2, φ — автоморфизм группы G , P — соответствующее автоморфизму φ полупрямое произведение группы G и бесконечной циклической группы T . И пусть A — матрица автоморфизма φ в некотором базисе группы G , E — единичная 2×2 -матрица. Если $\det(A + E) \neq 0$, то группа P является \mathcal{F}_p -аппроксимируемой тогда и только тогда, когда число p делит $\det(A - E)$. Если же $\det(A + E) = 0$, то группа P является \mathcal{F}_p -аппроксимируемой тогда и только тогда, когда $p = 2$.

Эта теорема может быть доказана с помощью сформулированного выше критерия \mathcal{F}_p -аппроксимируемости полупрямого произведения свободной абелевой группы конечного ранга и бесконечной циклической группы. Независимое доказательство теоремы 3 приведено в разделе 2.

Непосредственным следствием теоремы 3 является следующий результат.

Следствие. Пусть π — произвольное конечное множество простых чисел, и m — произведение всех чисел из π . Если полупрямое произведение P свободной абелевой группы G ранга 2 и бесконечной циклической группы T задается с помощью автоморфизма φ группы G , имеющего в некотором базисе группы G матрицу

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & m + 2 \end{pmatrix},$$

то $\pi_P = \pi$.

Отсюда следует справедливость теоремы 1. Поэтому в доказательстве нуждаются только теоремы 2 и 3.

2. Доказательство теоремы 3

Пусть G — свободная абелева группа ранга 2, φ — автоморфизм группы G , P — соответствующее автоморфизму φ полупрямое произведение группы G и бесконечной циклической группы $T = \langle t \rangle$. Тогда P — расщепляемое расширение группы G с помощью группы T , и для каждого элемента $g \in G$ имеет место равенство $t^{-1}gt = g\varphi$. Обозначим через A матрицу автоморфизма φ в некотором базисе группы G , а через E — единичную 2×2 -матрицу. Докажем теорему 3, т. е. следующие два утверждения.

1. Если $\det(A + E) \neq 0$, то группа P является \mathcal{F}_p -аппроксимируемой тогда и только тогда, когда число p делит $\det(A - E)$.

2. Если $\det(A + E) = 0$, то группа P является \mathcal{F}_p -аппроксимируемой тогда и только тогда, когда $p = 2$.

Пусть $\gamma_n(P)$ — n -й член нижнего центрального ряда группы P (где, напомним, $\gamma_1(P) = P$ и $\gamma_{n+1}(P)$ — взаимный коммутант $\gamma_n(P)$ и P).

Покажем, что для любого $n \geq 2$ подгруппа $\gamma_n(P)$ совпадает с подгруппой $G(\varphi - id)^{n-1}$, т. е. с образом группы G относительно ее эндоморфизма $(\varphi - id)^{n-1}$, где id — тождественный эндоморфизм группы G . Сразу заметим, что это утверждение мы докажем без предположения о двупорожденности группы G . Для нас здесь существенна только

ее коммутативность, которая позволяет использовать стандартные операции сложения и умножения в кольце эндоморфизмов группы G .

Пусть $n \geq 2$. Тогда, как легко видеть, $\gamma_n(P) \leq G$ и произвольный элемент из подгруппы $\gamma_n(P)(\varphi - id)$ имеет вид

$$a(\varphi - id) = t^{-1}ata^{-1},$$

где $a \in \gamma_n(P)$. Поэтому $\gamma_n(P)(\varphi - id) \subseteq \gamma_{n+1}(P)$. Верно и обратное включение. В самом деле, $\gamma_{n+1}(P)$ порождается элементами вида

$$t^{-k}at^ka^{-1} \quad (a \in \gamma_n(G), k \in \mathbb{Z}),$$

и эти элементы принадлежат $\gamma_n(P)(\varphi - id)$, так как для любого элемента $a \in \gamma_n(P)$ и для любого целого положительного числа l

$$t^{-l}at^la^{-1} = a(\varphi^l - id) = a(id + \varphi + \varphi^2 + \dots + \varphi^{l-1})(\varphi - id) \in \gamma_n(P)(\varphi - id);$$

$$\begin{aligned} t^lat^{-l}a^{-1} &= a(\varphi^{-l} - id) = a(-\varphi^{-l})(\varphi^l - id) \\ &= a(-\varphi^{-l})(id + \varphi + \varphi^2 + \dots + \varphi^{l-1})(\varphi - id) \in \gamma_n(P)(\varphi - id). \end{aligned}$$

Таким образом, $\gamma_{n+1}(P) = \gamma_n(P)(\varphi - id)$ при всех $n \geq 2$. Аналогично проверяется, что $\gamma_2(P) = G(\varphi - id)$. Из последних двух обстоятельств следует, что для каждого $n \geq 2$

$$\gamma_n(P) = G(\varphi - id)^{n-1}. \quad (2)$$

Хорошо известно, что если эндоморфизм ψ свободной абелевой группы V конечного ранга инъективен, то индекс $[V : V\psi]$ совпадает с модулем определителя матрицы эндоморфизма ψ . Отсюда и из того, что матрица эндоморфизма $(\varphi - id)^{n-1}$ совпадает с матрицей $(A - E)^{n-1}$, следует, что если число $d = \det(A - E)$ отлично от нуля, то

$$[G : G(\varphi - id)^{n-1}] = |\det(A - E)|^{n-1} = |d|^{n-1},$$

и тогда в силу (2) для каждого $n \geq 2$

$$[G : \gamma_n(P)] = |d|^{n-1}. \quad (3)$$

Обозначим через $\pi(d)$ множество всех простых делителей числа d , а через π_P — множество всех простых чисел p , для которых группа P \mathcal{F}_p -аппроксимируема. Эти обозначения позволяют переформулировать теорему 3 следующим образом.

1. Если $\det(A + E) \neq 0$, то $\pi_P = \pi(d)$.
2. Если $\det(A + E) = 0$, то $\pi_P = \{2\}$.

Для доказательства первой части теоремы проверим сначала, что

$$\det(A + E) \neq 0 \wedge d \neq 0 \implies \pi_P = \pi(d). \quad (4)$$

В самом деле, пусть $\det(A + E) \neq 0$ и $d \neq 0$. Так как $\det(A \pm E) \neq 0$, то для любого неединичного элемента $h \in G$ имеем $h(\varphi \pm id) \neq 1$, т. е. $t^{-1}ht \neq h^{\pm 1}$. Поэтому в G нет неединичных циклических подгрупп, инвариантных в P .

Покажем сначала, что $\pi(d) \subseteq \pi_P$. Пусть $p \in \pi(d)$. Так как $d \neq 0$, то в силу (3) для каждого $n \geq 2$ группа $G_n = G/\gamma_n(P)$ является конечной абелевой группой порядка

$|d|^{n-1}$. Отсюда и из того, что $p \in \pi(d)$, следует, что p^{n-1} делит порядок группы G_n . Поэтому, если F_n — p -компонента группы G_n , то $|F_n| \geq p^{n-1}$. Пусть Q_n — произведение всех примарных компонент группы G_n , отличных от F_n . Тогда $G_n/Q_n \simeq F_n$ — конечная p -группа. Так как $Q_n \leq G_n = G/\gamma_n(P)$, то $Q_n = L_n/\gamma_n(P)$, где L_n — подгруппа группы G , содержащая $\gamma_n(P)$. Поскольку Q_n характеристична в G_n и G_n инвариантна в $P_n = P/\gamma_n(P)$, то Q_n инвариантна в P_n . Отсюда следует, что L_n инвариантна в P . Так как $\gamma_n(P)$ содержится в L_n , то фактор-группа P/L_n нильпотентна и, кроме того, она является расщепляемым расширением конечной p -группы

$$G/L_n \simeq (G/\gamma_n(P)) / (L_n/\gamma_n(P)) = G_n/Q_n \simeq F_n$$

с помощью субнормальной бесконечной циклической подгруппы. Поэтому группа P/L_n \mathcal{F}_p -аппроксимируема в силу сформулированной выше теоремы 2. Так как $|G/L_n| = |F_n| \geq p^{n-1}$, то индексы подгрупп L_n в группе G не ограничены. Поэтому подгруппа

$$L = \bigcap_{n=2}^{\infty} L_n$$

имеет в G бесконечный индекс. Отсюда и из того, что G — свободная абелева группа ранга 2, следует, что L — циклическая группа, являющаяся, к тому же, инвариантной подгруппой группы P . Но выше отмечалось, что G не содержит неединичных циклических подгрупп инвариантных в P . Поэтому $L = 1$, т. е. P аппроксимируема фактор-группами P/L_n , которые, в свою очередь, \mathcal{F}_p -аппроксимируемы. Отсюда следует, что P является \mathcal{F}_p -аппроксимируемой, т. е. $p \in \pi_P$.

Покажем теперь, что $\pi_P \subseteq \pi(d)$. Предположим, что $p \in \pi_P$, и покажем, что тогда $p \in \pi(d)$. Допустим противное, т. е. допустим, что p взаимно просто с d . Пусть ρ — гомоморфизм группы P на конечную p -группу. Так как любая конечная p -группа нильпотентна, то гомоморфизм ρ проходит через естественный гомоморфизм $P \rightarrow P/\gamma_n(P)$ для достаточно большого n . Отсюда и из того, что порядок группы $G/\gamma_n(P)$ в силу (3) совпадает с числом $|d|^{n-1}$, взаимно простым с p , следует, что $G\rho = 1$. Это противоречит тому, что $p \in \pi_P$. Таким образом, $\pi_P \subseteq \pi(d)$, и утверждение (4) доказано.

Теперь для доказательства первой части теоремы нам остается проверить, что

$$\det(A + E) \neq 0 \wedge d = 0 \implies \pi_P = \pi(d). \quad (5)$$

Пусть $\det(A + E) \neq 0$ и $d = 0$. Покажем, что $\pi_P = \pi(d)$. Так как $d = 0$, то множество $\pi(d)$ совпадает с множеством всех простых чисел. По сформулированной выше теореме Грюнберга конечно порожденная нильпотентная группа без кручения \mathcal{F}_p -аппроксимируема для любого простого числа p . Поэтому доказательство равенства $\pi_P = \pi(d)$ сводится к доказательству нильпотентности группы P . Так как $d = 0$, то эндоморфизм $\varphi - \text{id}$ не инъективен. Отсюда и из того, что $\varphi - \text{id}$ — эндоморфизм свободной абелевой группы G ранга 2 следует, что $G(\varphi - \text{id})$ — циклическая группа. Но в силу (4) $G(\varphi - \text{id}) = \gamma_2(P)$. Поэтому $\gamma_2(P)$ порождается некоторым элементом $h \in G$. Так как $\gamma_2(P)$ нормальна в P , то $t^{-1}ht = h^{\pm 1}$. Покажем, что $t^{-1}ht = h$. Допустим противное. Тогда $t^{-1}ht = h^{-1}$ и $h \neq 1$. Отсюда следует, что эндоморфизм $\varphi + \text{id}$ не инъективен. Но это невозможно, поскольку $\det(A + E) \neq 0$. Таким образом, $t^{-1}ht = h$. Поэтому $\gamma_2(P)$ — центральная подгруппа группы P , и, следовательно, группа P нильпотентна. Утверждение (5) доказано.

Докажем теперь вторую часть теоремы, т. е. следующее утверждение:

$$\det(A + E) = 0 \implies \pi_P = \{2\}. \quad (6)$$

Пусть $\det(A+E) = 0$. Покажем, что $\pi_P = \{2\}$. Так как $\det(A+E) = 0$, то в G существует неединичный элемент h такой, что $t^{-1}ht = h^{-1}$. Обозначим через x элемент группы G , являющийся корнем из h максимальной возможной степени. Так как извлечение корня в G обладает свойством однозначности и $t^{-1}ht = h^{-1}$, то $t^{-1}xt = x^{-1}$. Поэтому циклическая подгруппа X группы G , порожденная элементом x , инвариантна в G . В силу выбора элемента x подгруппа X изолирована в G . Таким образом, X — бесконечная циклическая изолированная подгруппа свободной абелевой группы G ранга 2. Поэтому G/X — бесконечная циклическая группа причем, как отмечалось выше, X инвариантна в P . Мы получаем, таким образом, в группе P нормальный ряд $1 \leq X \leq G \leq P$ с циклическими факторами. Следовательно, группа P сверхразрешима, причем она не является нильпотентной, поскольку $t^{-1}ht = h^{-1}$. Поэтому требуемое равенство $\pi_G = \{2\}$ вытекает из следующих двух уже сформулированных выше результатов Д. И. Молдавского и Д. Н. Азарова: любая сверхразрешимая группа без кручения \mathcal{F}_2 -аппроксимируема; если сверхразрешимая группа \mathcal{F}_p -аппроксимируема для нечетного простого числа p , то она нильпотентна. Утверждение (6) доказано.

3. Доказательство теоремы 2

Пусть P — расщепляемое расширение конечно порожденной \mathcal{F}_p -аппроксимируемой группы G с помощью \mathcal{F}_p -аппроксимируемой группы T , субнормальной в P . Покажем, что группа P является \mathcal{F}_p -аппроксимируемой.

Рассмотрим сначала частный случай, когда группа G является конечной p -группой. В этом случае индекс $[P : T]$ конечен и является степенью числа p . Так как T — субнормальная подгруппа группы P , то существует последовательность

$$T = P_0 \leq P_1 \leq \dots \leq P_n = P$$

такая, что для каждого $k = 1, 2, \dots, n$ подгруппа P_{k-1} нормальна в P_k . Очевидно, что P_k/P_{k-1} — конечная p -группа. Хорошо известно и легко проверяется (см., например, [6]), что любое расширение \mathcal{F}_p -аппроксимируемой группы с помощью конечной p -группы само является \mathcal{F}_p -аппроксимируемой группой. Поэтому, используя \mathcal{F}_p -аппроксимируемость группы T , индукцией по n легко видеть, что группа P является \mathcal{F}_p -аппроксимируемой.

Для доказательства теоремы в общем случае достаточно для каждого неединичного элемента $f \in P$ указать нормальную подгруппу N группы P , не содержащую элемент f и такую, что фактор-группа P/N \mathcal{F}_p -аппроксимируема. Если $f \notin G$, то в качестве N можно взять подгруппу G , так как $P/G \cong T$ — \mathcal{F}_p -аппроксимируемая группа. Пусть теперь $f \in G$. Так как группа G является \mathcal{F}_p -аппроксимируемой, то в ней существует нормальная подгруппа R , не содержащая элемент f и такая, что G/R — конечная p -группа. Пусть теперь V — множество всех групповых слов, тождественно равных 1 в группе G/R . И пусть $V(G)$ — вербальная подгруппа группы G , соответствующая множеству V . Тогда имеет место включение $V(G) \subseteq R$. Кроме того, ввиду локальной конечности любого многообразия, порожденного конечной группой (см., например, [13, гл. 5, п. 2, упр. 8]), группа $G/V(G)$ конечна, и более того, она, очевидно, является p -группой. Так как $V(G) \subseteq R$ и $f \notin R$ то $f \notin V(G)$. Так как подгруппа $V(G)$ вербальна в G и G нормальна в P , то $V(G)$ нормальна в P . При этом фактор-группа $P/V(G)$ представляет собой расщепляемое расширение конечной p -группы $G/V(G)$ с помощью \mathcal{F}_p -аппроксимируемой группы $TV(G)/V(G) \cong T$, причем $TV(G)/V(G)$ субнормальна в

$P/V(G)$. Поэтому в силу рассмотренного выше частного случая группа $P/V(G)$ является \mathcal{F}_p -аппроксимируемой. Таким образом, $V(G)$ — нормальная подгруппа группы P , не содержащая элемент f и такая, что группа $G/V(G)$ является \mathcal{F}_p -аппроксимируемой. Поэтому в качестве искомой подгруппы N можно взять $V(G)$. Теорема 2 доказана.

Литература

1. Чандлер Б., Магнус В. Развитие комбинаторной теории групп.—М.: Мир, 1985.—249 с.
2. Мальцев А. И. Об изоморфном представлении бесконечных групп матрицами // Мат. сб.—1940.—Т. 8.—С. 405–422.
3. Мальцев А. И. Обобщенно нильпотентные алгебры и их присоединенные группы // Мат. сб.—1949.—Т. 25.—С. 347–366.
4. Hirsh K. A. On infinite soluble groups // J. London Math. Soc.—1952.—Vol. 27.—P. 81–85.
5. Шмелькин А. Л. Полициклические группы // Сиб. мат. журн.—1968.—Т. 9.—С. 234–235.
6. Gruenberg K. W. Residual properties of infinite soluble groups // Proc. London Math. Soc.—1957.—Vol. 3 (7), № 25.—P. 29–62.
7. Азаров Д. Н. Аппроксимируемость разрешимых групп конечного ранга некоторыми классами конечных групп // Изв. вузов. Математика.—2014.—№ 8.—С. 18–29.
8. Азаров Д. Н., Молдаванский Д. И. Аппроксимируемость сверхразрешимых групп конечными p -группами // Научн. тр. Иван. гос. ун-та. Математика.—1999.—Вып. 2.—С. 8–9.
9. Сексенбаев К. К теории полициклических групп // Алгебра и логика.—1965.—Т. 4, вып. 3.—С. 79–83.
10. Мальцев А. И. О гомоморфизмах на конечные группы // Учен. зап. Иван. гос. пед. ин-та.—1958.—Т. 18.—С. 49–60.
11. Азаров Д. Н. О почти аппроксимируемости конечными p -группами // Чебышевский сб.—2010.—Т. 11, вып. 3.—С. 11–20.
12. Aschenbrenner M., Friedl S. Residual properties of graph manifold groups // Topology Appl.—2011.—Vol. 158 (10)—P. 1179–1191.
13. Каргаполов М. И., Мерзляков Ю. И. Основы теории групп.—М.: Наука, 1972.—239 с.

Статья поступила 29 июля 2014 г.

АЗАРОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Ивановский государственный университет,
доцент кафедры алгебры и математической логики
РОССИЯ, 153025, Иваново, ул. Ермака, 37
E-mail: azarovdn@mail.ru

SOME RESIDUAL PROPERTIES OF POLYCYCLIC GROUPS AND SPLIT EXTENSIONS

Azarov D. N.

It is proved that for every finite set π of primes there exists a polycyclic group which is a residually finite p -group if and only if the number p belongs to the set π .

Key words: polycyclic group, split extension.